

Kajian Pengaruh Suhu dan Lama Ekstraksi Secara Pengukusan Terhadap Kadar Albumin Ikan Gabus (*Ophiocephalus striatus*)

Matheus Nugroho

Dosen Program Studi Teknologi Hasil Perikanan
Fakultas Pertanian Universitas Yudharta Pasuruan

Abstract

*The objective of this study is to determine the temperature and duration of the right steaming extraction to obtain albumin content and yield that optimal from the Gabus fish (*Ophiocephalus striatus*). The research method is to determine the temperature in the range 40-90°C, and the steaming extraction waterbath for 25-35 minutes, to obtain yield and albumin content of optimal fish Gabus coarse extract. Testing temperature and extraction time is steaming toward yield, albumin content and albumin yield of fish Gabus meat using Group Randomized Factorial design analysis (RAKF). The results showed that no interaction between the various factors treated with the higher temperature range of 40-90°C, and the range of 25-35 minutes longer steaming. The highest albumin yield extract of the common snakehead of 2.459 g/100g fish, by steaming temperature 60°C for 25-35 minutes*

*Key words: fish Gabus (*Ophiocephalus striatus*), extraction, yield*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menentukan suhu dan lama ekstraksi pengukusan yang tepat untuk mendapatkan rendemen dan kadar albumin yang optimal dari ikan gabus (*Ophiocephalus striatus*). Metode penelitian adalah menentukan suhu pada kisaran 40-90°C, dan ekstraksi secara pengukusan *waterbath* selama 25-35 menit, untuk mendapatkan rendemen dan kadar albumin ekstrak kasar ikan gabus yang optimal. Pengujian suhu dan lama ekstraksi secara pengukusan terhadap rendemen, kadar albumin dan rendemen albumin daging ikan gabus menggunakan analisa Rancangan Acak Kelompok Faktorial (RAKF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan interaksi antara berbagai faktor perlakuan dengan semakin tinggi suhu kisaran 40-90°C, dan lama pengukusan kisaran 25-35 menit. Rendemen albumin tertinggi ekstrak ikan gabus sebesar 2,459 g/100g, oleh suhu pengukusan 60°C selama 25-35 menit.

Kata kunci : ikan gabus (*Ophiocephalus striatus*), ekstraksi, rendemen

Pendahuluan

Salah satu protein sederhana dalam plasma darah adalah albumin. Albumin dalam tubuh disintesa di dalam hati dengan jumlah sangat kecil. Kekurangan albumin dalam serum dapat mempengaruhi pengikatan dan pengangkutan senyawa-senyawa endogen dan

eksogen, termasuk obat-obatan, karena seperti diperkirakan distribusi obat ke seluruh tubuh pengikatannya melalui fraksi albumin (Goldstein *et al.*, 1968; Vallner, 1977; Tandra *et al.*, 1988). Jika kadar albumin serum berada dibawah nilai normal, maka fraksi obat yang terikat protein tersebut

berkurang, dengan kata lain fraksi obat bebas banyak sehingga keadaan ini dapat menimbulkan pengaruh obat yang tidak diinginkan.

Pengadaan albumin terutama untuk kasus bedah saat ini mencapai 91%, 2/3 albumin tersebut dipakai di bagian bedah dan sisanya 1/3 bagian dipergunakan untuk penanganan penyakit dalam. Albumin merupakan komoditi impor, pada masa sebelum krisis moneter, harga infus albumin berkisar Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-. Pada saat kurs dollar terhadap nilai rupiah meningkat hampir empat kali, harga serum albumin untuk infus mencapai Rp. 1.100.000,- sampai dengan Rp. 1.300.000,- per botol kemasan 100 ml-20% albumin (Alexander *et al.*, 1979; Tullis, 1997).

Uji coba telah dilakukan oleh instalasi gizi dan bagian bedah RSUD. Dr. Syaiful Anwar Malang selama 1979-1998, berupa pemberian filtrat dari 2 kg/hari ikan gabus terhadap pasien pasca operasi, ibu yang baru melahirkan dan beberapa pasien luka tusukan, yang mempunyai kadar albumin rendah (2,8 g/dl), selama 2-4 hari terjadi peningkatan albumin tubuh menjadi 4,4-5,5 g/dl (kadar albumin normal tubuh manusia), dan permukaan luka mengalami penutupan. Proses pengukusan tersebut dilakukan pada suhu air mendidih (Soemarko, 1997).

Pengaruh perlakuan suhu tinggi menyebabkan perubahan melemahnya enzim proteinase dan nilai daya cerna protein (Nielsen *et al.*, 1988; Deshpande and Damodaran, 1989 dalam Folawiyo and Apenten, 1996). Menurut Stryer (1968), Slavik (1982) dan Arakawa *et al.* (1991) dalam Folawiyo and Apenten (1996), menjelaskan bahwa perlakuan panas pada albumin akan menghasilkan perubahan struktur yang tidak dapat balik (*irreversible*), yang terlihat dengan meningkatnya

protein yang tidak larut dalam air. Pengaruh perlakuan panas pada struktur albumin juga dapat albumin, sehingga diperlukan panas yang tepat pada struktur protein tersebut (Stryer, 1968; Slavik, 1982; Arakawa *et al.*, 1991; Wicker *et al.*, 1986 dan Arntfield *et al.*, 1989 dalam Folawiyo and Apenten, 1996).

Berdasarkan hasil penelitian pada ikan gabus dan ikan tomang didapatkan kadar albumin sebesar 1332,7 mg/100 g dan 1188,05 mg/100 g (Carvallo, 1998). Analisa kadar albumin pada filtrat ikan gabus hasil pengukusan suhu 98°C adalah 19,4% (Martini, 1998). Hasil analisa sterilisasi ikan gabus pada suhu 121°C selama 25 menit didapatkan kadar albumin filtrat adalah 116,419 ± 22,660 mg/100 g (Hidayati, 1999). Hal ini semua memperkuat alasan untuk memperoleh isolat albumin hasil ekstraksi secara pengukusan ikan gabus sebagai pengganti serum albumin impor dalam upaya membantu mempertahankan dan meningkatkan nilai gizi dan kesehatan manusia, sehingga dapat mengurangi anggaran biaya kesehatan yang makin mahal.

Materi dan Metode

Bahan-bahan yang digunakan untuk ekstraksi adalah ikan gabus yang diperoleh dari bendungan Karangates dalam keadaan hidup dan aquadest. Bahan untuk uji kadar albumin menggunakan metode *brom cresol green* adalah *buffer succinate* (7 mmol/l pH 4,2), brom cresol green 0,15 mmol/l, brij 35 dan aquadest dapar succinate (0,01 M; pH 4,2), untuk kadar albumin setelah pemurnian kolom filtrasi gel pengujiannya dengan UV, bahannya antara lain BSA standar 0,5 g/l, buffer phosphat 0,1 M pH 7,1 dan aquadest.

Peralatan yang dipergunakan pembuatan ekstrak kasar ikan gabus antara lain : pisau, gunting, waterbath, thermokopel,

thermometer 100°C, timbangan gelas ukur, kain saring, plastik dan press hidrolik. Peralatan untuk analisa kadar albumin antara lain : kuvet diameter 1 cm, Shimadzu spectrophotometer UV-100-02 dan spectrophotometer SMA *autoanalyzer*.

Prosedur penelitian ini meliputi: ekstraksi ikan gabus secara pengukusan *waterbath* (Modifikasi Sajdok *et al.*, 1989) dan penentuan kadar albumin (Doumas; Watson and Biggs, 1971).

Analisa data yang digunakan dalam pengujian pengaruh suhu dan lama ekstraksi secara pengukusan terhadap rendemen, kadar albumin dan rendemen albumin ikan gabus menggunakan analisa Rancangan Acak Kelompok (RAKF).

Hasil dan Pembahasan

Hasil pengamatan pada Tabel 1. Menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu dan lama pengukusan *waterbath*, pada kisaran suhu 40-90°C dengan lama 25-35 menit menghasilkan rerata rendemen ekstrak kasar semakin besar. Kenaikan ini diduga berkaitan dengan menurunnya rehidrasi

jaringan ikat daging ikan gabus, sebagai akibat meningkatnya suhu dan lama pengukusan. Pada kondisi rehidrasi menurun kondisi kemampuan daging menahan air hilang, karena ruang antar jaringan ikat daging mengkerut dan berkurang volumenya, sehingga air dalam daging menguap dan keluar sebagai cairan. Rustad and Nesse (1983) melaporkan bahwa nilai *rehydration index* cenderung menurun pada perlakuan pemanasan antara 30-75°C dengan lama 5-30 menit. Suhu pemanasan 30°C dengan lama 5 menit mempunyai *rehydration index* paling tinggi, sedangkan suhu pemanasan 75°C dengan lama 30 menit mempunyai *rehydration index* paling rendah. Penurunan tersebut berlanjut sampai dengan suhu pemanasan 90°C.

Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan suhu dan lama pengukusan *waterbath* interaksinya tidak berpengaruh nyata, tetapi mandirinya berpengaruh sangat nyata terhadap rendemen ekstrak kasar ikan gabus.

Tabel 1. Rendemen ekstrak kasar karena pengaruh perlakuan suhu dan lama ekstraksi pengukusan *waterbath*

Suhu pengukusan <i>waterbath</i> (°C)	Rendemen (%)
40	13,1 a
50	13,9 a
60	20,3 c
70	17,5 b
80	21,1 cd
90	22,9 d
BNT ($\alpha = 0,01$)	3,663
Lama pengukusan (menit)	Rendemen (%)
25	14,7 a
30	19,2 ab
35	20,6 b
BNT ($\alpha = 0,01$)	5,182

Keterangan : angka rendemen yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji BNT ($\alpha = 0,01$)

Hasil uji BNT ($\alpha = 0,01$) menunjukkan bahwa perlakuan suhu pengukusan *waterbath* 90°C (suhu daging 66°C) memberikan nilai rendemen ekstrak kasar tertinggi yaitu 22,9%. Hal ini diduga karena jaringan ikat daging ikan relatif porous dan membentuk *agreggat*, sehingga kemampuan rehidrasi dari jaringan ikat menurun, pada kondisi tersebut dapat mempermudah proses pemisahan cairan saat pengepresan. Irianto *et al.* (1986) menjelaskan bahwa pemanasan menciptakan struktur yang porous, karena ikatan protein akan saling memisah dan membentuk *agreggat*, sehingga mempermudah pemisahan cairan saat pengepresan.

Waktu optimal untuk menghasilkan rendemen ekstrak kasar tertinggi adalah 35 menit dengan nilai rendemen sebesar 20,6%. Hal tersebut diduga pada lama pengukusan 35 menit kisaran suhu 40-90°C, telah menyebabkan kemampuan menahan air dari daging ikan menurun, ruang antar serabut urat daging ikan gabus menjadi porous, sehingga cairan sel yang terikat dalam jaringan keluar. Rustad and Nesse (1983) menyatakan bahwa permulaan menurunnya kemampuan menahan air daging capelin yang dicincang terjadi pada lama pemanasan 5-30 menit, dengan kisaran suhu 30-35°C. Lama pemanasan 30 menit mempunyai *water holding capacity* lebih rendah dibandingkan lama pemanasan 5 menit.

Berdasarkan hasil analisa kadar albumin ekstrak kasar ikan

gabus menunjukkan, bahwa semakin tinggi suhu dan lama pengukusan dengan *waterbath* suhu 40-90°C dan waktu pengukusan 25-35 menit, menghasilkan kadar albumin semakin rendah. Folawiyo and Apenten (1996) menyatakan bahwa pemanasan daging suhu 90°C, selama 20 menit menyebabkan struktur albumin *irreversible*, hal itu ditandai dengan meningkatnya permukaan protein non polar, dan perubahan sifat fungsionalnya. Foegeding *et al.* (1986) menyatakan, bahwa pada suhu 95°, unit ikatan yang terbentuk cukup banyak, dan protein tidak lagi terdispersi sebagai koloid, tetapi albumin mengalami koagulasi dan mengarah terjadinya denaturasi.

Hasil uji BNT ($\alpha = 0,01$) menunjukkan bahwa kadar albumin ekstrak kasar tertinggi adalah 145,7 mg/g, hasil perlakuan suhu pengukusan *waterbath* 40°C (suhu daging 36°C). Kadar albumin tinggi, diduga karena kelarutan albumin dalam ekstrak kasar ikan gabus belum mengalami kerusakan, secara visual tampak kekeruhan ekstrak kasar belum meningkat, larutan berwarna jernih kemerahan, partikel-partikel ekstrak tidak mengendap meskipun dibiarkan, dan masih dapat menimbulkan ketegangan pada larutan ekstrak tersebut. Winarno (1997) menyatakan, bahwa larutan protein yang mengalami kerusakan sebagai akibat pemanasan, larutan protein tidak lagi terdispersi sebagai koloid, dan partikel-partikel tersebut cenderung terpisah dan mengendap ketika didiamkan.

Tabel 2. Kadar albumin ekstrak kasar ikan gabus karena pengaruh perlakuan suhu dan lama ekstraksi pengukusan *waterbath*

Suhu pengukusan <i>waterbath</i> (°C)	Kadar Albumin (mg/g)
40	145,7 c
50	130,2 c
60	119,5 bc
70	122,5 c
80	84,2 a
90	59,8 a
BNT ($\alpha = 0,01$)	27,816
Lama pengukusan (menit)	Kadar Albumin (mg/g)
25	124,6
30	104,7
35	101,7
BNT ($\alpha = 0,01$)	39,337

Keterangan : angka kadar albumin yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji BNT ($\alpha = 0,01$)

Lama pengukusan optimum untuk menghasilkan kadar albumin ekstrak kasar tertinggi adalah 25 menit, dengan kadar albumin sebesar 124 mg/g. Rustad and Neese (1983) menyatakan, bahwa ekstrak protein daging ikan cincangan cenderung meningkat kadarnya ketika dilakukan pemanasan pada suhu 30-40°C, dengan lama pemanasan 5-10 menit, selanjutnya jika lama pemanasan 10-30 menit, maka kadar ekstrak proteinnya cenderung terjadi penurunan.

Berdasarkan hasil analisa menunjukkan bahwa semakin menurun suhu pengukusan *waterbath* kisaran suhu 40-90°C, dengan lama pengukusan 25-35 menit, maka rendemen albumin daging semakin menurun. Rustad and Nesse (1983) menjelaskan hasil penelitiannya bahwa turunnya rehidrasi dan ekstrak protein semakin meningkat dengan meningkatnya suhu dan lama pemanasan, pada kisaran suhu 30-80°C, dengan lama pemanasan 5-30 menit. Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan suhu dan lama pengukusan, interaksinya tidak

berpengaruh nyata, begitu juga dengan lama pengukusan, hanya perlakuan suhu pengukusan yang memberikan pengaruh nyata.

Hasil uji BNT ($\alpha = 0,05$) menunjukkan bahwa rendemen albumin daging ikan gabus optimal adalah 2,459 g/100 g, dengan perlakuan suhu pengukusan *waterbath* 60°C (suhu daging 45°C). Optimalnya rendemen albumin tersebut, pada prinsipnya terkait dengan kondisi daging ikan gabus belum mengalami agregat secara keseluruhan, karena proses radiasi panas antar jaringan daging belumlah merata saat pengukusan *waterbath* suhu 60°C. Jaringan serabut urat daging ikan gabus belum mengkerut, kadar air dan rehidrasi belum turun, sehingga cairan sel yang keluar dari daging ikan gabus dan kandungan proteinnya masih kompleks dan tinggi. Raeker and Johnson (1995), menunjukkan bahwa permulaan denaturasi albumin plasma darah pada suhu (69,1 ± 0,2)°C. Shimada and Matsushita (1981) melaporkan, bahwa agregat daging mulai berkembang suhu 60-65°C.

Tabel 3. Rendemen albumin daging ikan gabus pengaruh perlakuan suhu dan lama ekstraksi pengukusan *waterbath*

Suhu pengukusan <i>waterbath</i> (°C)	Rendemen Albumin (g/100g)
40	1,917 b
50	1,847 b
60	2,459 c
70	2,049 b
80	1,714 b
90	1,289 a
BNT ($\alpha = 0,05$)	0,403
Lama pengukusan (menit)	Rendemen Albumin (g/100g)
25	1,791
30	1,889
35	1,959
BNT ($\alpha = 0,05$)	0,570

Keterangan : angka rendemen albumin yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji BNT ($\alpha = 0,05$)

Raeker and Johnson (1995), menunjukkan bahwa permulaan denaturasi albumin plasma darah pada suhu $(69,1 \pm 0,2)^\circ\text{C}$. Shimada and Matsushita (1981) melaporkan, bahwa agreggat daging mulai berkembang suhu $60-65^\circ\text{C}$.

Lama waktu pengukusan optimum, dengan nilai rendemen albumin daging ikan gabus tertinggi 1,959 g/100 g adalah 35 menit. Nilai tersebut ternyata tidak berbeda nyata dengan lama pengukusan 25 dan 30 menit. Tidak berbeda nyata tersebut diduga pada kisaran lama pengukusan *waterbath* 25-35 menit rendemen albumin daging ikan gabus yang dihasilkan relatif sama. Rustad and Nesse (1983) menyatakan bahwa lama pemanasan 30-35 menit, akan menurunkan rehidrasi daging, dan cairan daging mudah keluar, namun pada kisaran lama pemanasan tersebut terjadi penurunan kadar protein.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan interaksi antara berbagai faktor perlakuan dengan semakin tinggi suhu kisaran $40-90^\circ\text{C}$, dan lama pengukusan kisaran 25-35 menit. Rendemen

albumin tertinggi ekstrak ikan gabus sebesar 2,459 g/100g, oleh suhu pengukusan 60°C selama 25-35 menit.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, diharapkan dilakukan penelitian lanjutan mengenai pemurnian albumin dan penentuan berat molekul dari ekstraksi secara pengukusan rendemen dan kadar albumin yang paling optimal.

Daftar Pustaka

- Alexander, M.R.; Ambre, J.J.; Liskon, B.I. and D.C. Trash, 1979. Therapeutic Use Of Albumin. JAMA., 241 : 2527-2529.
- Arntfield, S. D.; Murray, E. D. and M. A. H. Ismond, 1986. Effect of Salt on the Thermal Stability of Storage Proteins from Fababebean (Vice faba). J. Food Sci., 51 : 371-377.
- Carvallo, Y. N., 1998. Study Profit Asam Amino, Albumin, Mineral Zn pada Ikan Gabus (*Ophiocephalus sriatus*) dan Ikan Tomang (*Ophiocephalus*

- Micropeltus). Fakultas Perikanan. Universitas Brawijaya. Malang. Hal 28-30.
- Doumas, B.T.; Watson, W.A. and H.G. Biggs, 1971. Albumin Standard and The Measurement of Serum Albumin with Brom Cresol Green. *J. Clin Chim Acta.*, 31 : 87.
- Foegeding, E. A.; Allen, C. E. and W. R. Dayton, 1986. Effect of Heating Rate on Thermally Formed Myosin, Fibrinogen and Albumin Gels. *J. Food Sci.*, 51 : 104-107.
- Folawiyo, Y. L. and O. R. K. Apenten, 1996. The Effect of Heat Acid Treatment on The Structure of Rapeseed Albumin (Napin). *J. Food Sci.*, 61 : 237-239.
- Goldstein, A.; Aronow, L. and S. M. Kalman, 1968. Principles of Drug Action-The Basis of Pharmacology. New York. Page, 45-112.
- Hidayati, O., 1999. Study Kadar Albumin, Zn dan TVB Filtrat Ikan Gabus (*Ophiocephalus sriatus*) pada Lama Sterilisasi dan Penyimpanan yang Berbeda. Laporan Penelitian. Fakultas Perikanan. Universitas Brawijaya. Malang. Hal 36.
- Irianto, H. E.; Suryaningrum, T. D.; Suparno dan Muljanah, 1995. Penghambatan Pembusukan "Press Liquor" dari Pengolahan Tepung Ikan dengan Perlakuan Asam Formiat dan Pemanasan. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia.*, 1 : 1-5.
- Martini, N. D., 1998. Pengaruh Lama Pengukusan Terhadap Kandungan Albumin, Asam Amino dan Zn pada Ikan Gabus (*Ophiocephalus sriatus*). Laporan Penelitian. Fakultas Perikanan. Universitas Brawijaya. Malang. Hal 36.
- Raeker, M.O. and Johnson, 1985. Thermal and Function Properties of Bovine Blood Plasma and Egg White Protein. *J. Food Sci.*, 60 : 687.
- Rustad, T. and N. Nesse, 1983. Heat Treatment and Drying Capelin Mince, Effect on Water Binding and Soluble Protein. *J. Food Sci.*, 48 : 1320-1347.
- Sadjok, J.; Pozarkova, D.; Rauch, P. and J. Kas, 1989. Thermal Denaturation of Hen Egg White Studied by Chromatographic and Immunochemical Techniques. *J. Food Sci.*, 54 : 906-908.
- Shimada, K. and S. Matsushita, 1981. Effect of Salts and Denaturations on Thermocoagulation of Proteins. *J. Agric Food Chem.*, 29 : 15.
- Soemarko, 1997. Pengaruh Diet Ikan Kutuk dan Telur Terhadap Peningkatan Albumin dan Penutupan Luka Operasi. Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar. Malang. Hal 1-28.
- Tandra, H.; Soemartono, H.W. dan A. Tjokroprawiro, 1988. Metabolisme dan Aspek Klinik Albumin. *J. Med.*, 3 : 249-258.
- Tullis, J. L., 1997. Albumin 2 Guidelines for Clinical Use. *JAMA.*, 237 : 460-463.
- Vallner, J. J., 1977. Binding of Drugs By Albumin and Plasma Protein. *J. Pharm Sci.*, 66 ; 447-449.
- Winarno, F. G., 1997. Kimia Pangan dan Gizi. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Hal. 61-68.

